



DR. ASSASSI

CENTRE DE  
CHIRURGIE PLASTIQUE  
ET ESTHÉTIQUE



ACIDE HYALURONIQUE  
LIPPOFILLING

## VISAGE

---

Correction des paupières  
Lifting du visage  
Lifting des sourcils  
Otoplastie  
Rhinoplastie  
Greffes de graisse autologue

## SEINS

---

Augmentation mammaire  
Réduction mammaire  
Lifting des seins  
Poitrine tubulaire  
Gynécomastie

## CORPS

---

Liposuction (WAL/ TLA)  
Lipofilling  
Abdominoplastie  
Bodylift  
Operations de Raffermissement  
Lipodème  
Chirurgie intime

## ANTI-VIEILLISSEMENT

---

Toxine botulique (également pour la migraine/  
bruxisme/ hyperhidrose)  
**L'acide hyaluronique**  
Needling médical  
PRP (traitement sanguin autologue)  
Peeling

# ACIDE HYALURONIQUE

Lipofilling

## BOTOX

---

De nombreux facteurs influencent le moment auquel et l'intensité avec laquelle le relâchement cutané et les rides se manifestent au niveau du visage. Ceux-ci varient fortement d'un individu à l'autre. L'âge, des prédispositions génétiques, le mode de vie, la pesanteur, le rayonnement solaire et notre mimique (le rire, le plissement du front, etc.) laissent leurs traces au cours du vieillissement naturel.

Avec le temps qui passe, la peau perd simultanément de son élasticité juvénile et de sa capacité de régénération. Des pattes d'oie et des rides du rire se forment dans les zones d'épiderme fin et affaibli.

De profondes rides peuvent apparaître sur les joues et le front. La prédisposition personnelle et le mode de vie (alimentation, nicotine etc.) jouent un rôle important dans la formation des rides


chez chacun. De même, les personnes ayant une expression faciale très prononcée, comme p.ex. le plissement du front, remarqueront très tôt l'apparition de rides transversales sur le front.

Durant le processus de vieillissement, l'amincissement progressif des lèvres et le rétrécissement des mâchoires font que les lèvres perdent leur volume et de leur volupté et semblent plus minces.

Lorsque la peau est affaiblie et que les rides se sont formés dans le visage, l'expression faciale est en contradiction avec l'estime de soi-même, surtout s'il s'agit de personnes actives et énergétiques. Un traitement par injection d'acide hyaluronique permet d'y remédier pendant un certain laps de temps et de restaurer un aspect jeune et frais de la peau.

L'injection sous-cutanée permet de soulever les zones faciales affaissées et de remplir les rides. Un traitement par injection vise en premier lieu à améliorer la texture, la constitution visible et le toucher de l'épiderme.

D'autre part, le lipofilling (greffe de graisse auto-



logue) permet, grâce à une injection de graisse autologue prélevée dans d'autres zones du corps, de rendre du volume perdu dans certaines parties du visage sans pour autant créer un aspect artificiel. Le lipofilling donne des résultats durables, l'acide hyaluronique se résorbe après 8-12 mois selon individu.

Les raisons de ces durées d'efficacité différente s'expliquent par les caractéristiques individuelles telles que l'âge, la qualité de la peau, les prédispositions et le mode de vie.

Les nombreuses ridules dans les couches superficielles de l'épiderme autour de la bouche constituent un obstacle aux thérapies susmentionnées et ne peuvent pas être traitées efficacement par ces dernières. Dans ce cas-ci la dermabrasion cutanée constitue une méthode visant à améliorer la qualité de la couche superficielle de la peau.

Ces techniques permettent d'obtenir un aspect plus net de la surface extérieure de l'épiderme en supprimant les couches extérieures de la peau qui se regenèrent durant les semaines sui-

vant le traitement. Si les rides se caractérisent par une profondeur avancée et qu'il y a un affaissement de la peau faciale, le traitement par injection peut se révéler insuffisant. Il est alors recommandé de l'effectuer en combinaison avec un lifting du visage (Rhytidectomie).

La décision concernant la thérapie optimale à adopter dépend des problèmes individuels et des désirs individuels du patient. Cela est sujet d'une consultation médicale préalable détaillée envisageant tous les aspects.

## Quel est le genre d'analgésique utilisé ?

---

Certains fillers contiennent déjà des analgésiques de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à d'autres analgésiques.

Pour d'autres types de fillers ou si vous êtes particulièrement sensibles aux douleurs, il faut utiliser des crèmes anesthésiantes supplémentaires.

L'injection de graisse autologue nécessite une anesthésie locale de la zone de prélèvement

ainsi que de la zone d'injection.

## Acide hyaluronique

---

L'acide hyaluronique est un composant du tissu conjonctif humain qui est évidemment aussi présent sous forme naturelle dans l'épiderme. Il sert à égaliser de fines lignes, des plis et des cicatrices au niveau du visage et du cou.

## Lipofilling

---

Le tissu adipeux peut être prélevé à différents niveaux du corps comme au ventre, aux cuisses, aux fesses ou d'autres parties du patient. La méthode est connue sous la désignation « greffe de graisse autologue ».

Sous la rubrique traitements esthétiques du visage, le lipofilling sert essentiellement à reconstituer des joues ou pommettes affaissées, à corriger les rides du rire dans la partie inférieure du visage, à remplir les creux de l'épiderme, à renflouer les lèvres et à réduire les cernes.

Contrairement à l'acide hyaluronique le lipofil-

ling est un traitement permanent. Une partie de la graisse injectée (environ 25-30%) est résorbée de sorte que, dans de rares cas, un deuxième traitement (touch-up) s'avère nécessaire afin d'optimiser le résultat.

## Toxine botulique / Botox

Le traitement à la toxine botulique entraîne un affaissement temporaire de la musculature faciale, comme p. ex. au niveau du front, et réduit ainsi les rides du front et de la colère. L'effet n'est pas immédiat et ne se manifeste qu'après 2-3 jours après l'injection. Il se maintient pendant 3 à 5 mois.

## Après le traitement

Immédiatement après l'injection de légers picotements et pulsations pourront se manifester dans les zones traitées.

Dans de rares cas on observe l'apparition de légers hématomes qui se résorbent dans jours suivants le traitement.



En cas de lipofilling les signes susmentionnés comme des inflammations, des rougeurs, de petits hématomes pourront apparaître tant dans les zones de prélèvements que dans les zones d'injection.

La durée du résultat obtenu avec les substances résorbables est spécifique à chaque patient. Les facteurs essentiels sont le mode de vie, les prédispositions physiques de chaque patient ainsi que la zone traitée. Dans des zones faciales plus calmes le résultat obtenu se maintiendra toujours plus longtemps que dans des régions musculaires particulièrement actives.

Un entretien constitue la meilleure manière pour mettre au point les moments et les fréquences pour répéter un traitement afin de maintenir le résultat obtenu dans les meilleures conditions.

La plupart des patients sont très satisfaits du résultat obtenu par leur traitement d'injections et surpris de l'effet que cela a permis de leur procurer un air plus jeune.



Lors de votre premier rendez-vous, nous allons vous informer de manière détaillée sur l'intervention prévue, les risques impliqués et les éventuelles complications. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.

Si vous avez encore des questions, veuillez-nous contacter !

Source : VDÄPC

Note





DR.ASSASSI

CENTRE DE  
CHIRURGIE PLASTIQUE  
ET ESTHÉTIQUE



71, RUE DES GLACIS  
L-1628 LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG

TEL.: +352 26 27 02 93

WWW.DR-ASSASSI.LU INFO@DR-ASSASSI.LU