



DR. ASSASSI

CENTRE DE
CHIRURGIE PLASTIQUE
ET ESTHÉTIQUE



RÉSUMÉ

VISAGE | POITRINE | CORPS | ANTI-ÂGE
CHIRURGIE RECONSTRUCTIVE

VISAGE

Correction de la paupière supérieure

Correction de la paupière inférieure

Lifting du visage

Rhinoplastie

Greffes de graisse autologue

POITRINE

Augmentation mammaire

Réduction mammaire

Lifting des seins

Gynécomastie

CORPS

Liposuction

Lifting des cuisses

Abdominoplastie

Lifting des bras

ANTI-ÂGE

Toxine botulique

L'acide hyaluronique

CHIRURGIE RECONSTRUCTIVE

Corrections de cicatrices

Otoplastie

Déformation tubulaire des seins

Correction de mamelons

Tumeurs cutanées

Visage

Correction de la paupière supérieure

Des paupières tombantes donnent souvent au regard un air triste et fatigué. Le relâchement cutané et l'excédent de peau aux paupières supérieures, phénomènes qui caractérisent cette lourdeur des paupières, peuvent, dans des cas extrêmes, même entraver le champ visuel et provoquer des maux de tête chroniques. Nous vous proposons une méthode douce pour raffermir les paupières supérieures (blépharoplastie). Cette intervention consiste à prélever l'excédent de peau et du tissu musculaire ainsi que les amas de graisse, si nécessaire. La cicatrice est située dans le repli naturel de la paupière supérieure et n'est plus visible après la cicatrisation de la plaie.

Correction de la paupière inférieure

Le relâchement cutané affecte les tissus des contours aux paupières inférieures avec le vieillissement. Les petits amas de graisse naturels

se manifestent sous la forme de poches qui donnent aux paupières inférieures un aspect enflé. Grâce à une petite incision au bord inférieur de la paupière inférieure, il est possible de répartir les amas de graisse accumulée, de renforcer le muscle oculaire fin et de prélever l'excédent de peau. Après un certain temps la cicatrice n'est plus perceptible.

Lifting du visage

Le vieillissement, la pesanteur et l'exposition au soleil font souffrir le visage : la peau perd de son élasticité, certaines parties du visage se relâchent et des cernes peuvent marquer le front, les joues et la zone de la bouche. Le plus souvent, nous avons l'air fatigué et beaucoup plus âgé que nous nous sentons en fait. Un lifting du visage permet de raffermir la peau et le tissu conjonctif sous-cutané et de rendre simultanément le volume manquant à la partie centrale du visage. Les incisions sont effectuées dans les plis naturels devant l'oreille et dans le cuir chevelu de la tête.

Rhinoplastie

La rhinoplastie est l'intervention chirurgicale permettant une correction de la partie extérieure du nez et peut s'avérer nécessaire pour

des raisons esthétiques et/ou fonctionnelles, comme p. ex. un empêchement de la respiration nasale.

Il est essentiel d'analyser les difficultés de façon détaillée et d'établir un diagnostic approprié afin d'obtenir le meilleur résultat possible tant au niveau fonctionnel qu'esthétique.

Nous effectuons la rhinoplastie ouverte qui permet de réaliser une représentation exacte des structures du nez et, par cela même, une reconstruction précise. Il n'en restera qu'une petite cicatrice presque invisible.

Greffes de graisse autologue

Les greffes de graisse autologue (lipofilling, liposhifting) sont un moyen efficace pour augmenter le volume, tout particulièrement celui du visage. Elles sont également une alternative au traitement par l'acide hyaluronique. Par l'intermédiaire de micro-canules, on prélève du tissu adipeux (graisse) dans les zones du corps ayant un excédent de graisse, comme p. ex. les hanches ou le ventre. Suite à un traitement spécifique, celui-ci est réinjecté par des micro-canules. Après 6 semaines au plus tôt, un traitement ultérieur est éventuellement nécessaire en fonction du résultat obtenu lors de la première opération de transplantation. Nous recommandons particulièrement une greffe

de graisse autologue lorsque vous souhaitez avoir un lifting du visage ou une correction de la paupière inférieure puisque cela permettra d'obtenir un résultat global d'une parfaite harmonie esthétique.

Poitrine

Augmentation mammaire

L'augmentation mammaire est l'une des opérations esthétiques les plus fréquentes. Les femmes qui ont des seins affaissés ou trop petits peuvent obtenir une poitrine de forme naturelle et esthétique grâce aux implants au silicone. De nombreuses études scientifiques confirment que l'utilisation d'implants au silicone ne nuit pas à la santé. Nous utilisons exclusivement des implants certifiés conformes au label de qualité européen qui sont introduits par une incision discrète p. ex. dans le repli du sein, au tour du mamelon ou dans l'aisselle. La cicatrice est à peine visible plus tard.

Réduction mammaire

Une intervention chirurgicale peut être indiquée dans le cas d'une poitrine dont la taille est anormalement grande, tant pour des rai-

sons de santé que d'esthétique. Très vite cette poitrine entraîne une surcharge de la colonne cervicale et dorsale et, suite à cela, se manifestent des maux de nuque et de tête chroniques. Souvent, la raison de ces symptômes est ignorée. Des techniques d'opération spécifiques nous permettent de donner une forme esthétique et une taille naturelle à votre poitrine en réduisant son volume. Les cicatrices seront à peine visibles.

Lifting des seins

La grossesse, l'allaitement, les modifications du tissu conjonctif et les variations de poids peuvent occasionner un affaissement de la poitrine au fil du temps. La poitrine perd sa forme naturelle et esthétique. Lors d'un raffermissement de la poitrine, l'excédent de peau affaibli est prélevé et la glande mammaire est remodelée. L'intégration d'un implant au silicone permet de reconstituer la forme et la taille de votre poitrine, si le volume de la glande mammaire était trop faible. Grâce à cette opération effectuée sous anesthésie générale, votre poitrine sera de nouveau séduisante. Nous recommandons de porter un soutien-gorge spécial pendant 6 semaines après l'opération, de renoncer à toute pratique de sport et de ménager vos forces au cours de cette période.

Gynécomastie

La puberté, les troubles hormonaux et les médicaments peuvent donner lieu à une taille anormalement grande de la glande mammaire chez l'homme. Alors que, dans la majorité des cas, la gynécomastie se dissipe au cours de la puberté. L'augmentation de la taille varie d'un individu à l'autre. Il est primordial de déterminer la cause de la gynécomastie avant toute intervention chirurgicale. Si une opération est indiquée, il faut, en fonction de la taille de la glande mammaire, réduire celle-ci et prélever les amas de graisse par liposuccion et finalement raffermir l'enveloppe cutanée. Si uniquement la forme de la glande doit être modifiée, l'excédent de tissu est enlevé par une incision minuscule. Le tracé des cicatrices se trouve à un endroit à peine visible. Il est nécessaire de porter une veste de contention pour 4 à 6 semaines après l'opération, de renoncer à toute activité sportive et de ménager vos forces au cours de cette période de convalescence.

Corps

Liposuccion

Les amas de graisse locaux excédentaires

qui ne se laissent pas résorber par de mesures diététiques ou des activités sportives sont prélevés par la liposuccion. Chez les femmes les parties le plus souvent concernées sont les hanches, les fesses ainsi que les cuisses (« culotte de cheval »). Les parties problématiques chez l'homme sont la poitrine et la zone du ventre. Les amas de graisse sont prélevés de façon harmonieuse grâce à diverses canules d'aspiration. La liposuccion n'est pas indiquée pour prélever des amas de graisse afin de remédier à un excès de poids.

Lifting des cuisses

Si la peau a perdu de son élasticité suite à une perte de poids, les faces intérieures des cuisses se distinguent souvent par un relâchement cutané. Le lifting de cuisses est combiné à la liposuccion avec l'enlèvement de peau excessive.

Abdominoplastie

Des pertes de poids considérables ou des grossesses peuvent donner lieu à un relâchement de la paroi abdominale. Si les activités sportives et les changements alimentaires n'apportent pas le succès envisagé, les « bourrelets »

peuvent être prélevés par une intervention chirurgicale. Celle-ci n'est pas uniquement justifiée pour des raisons esthétiques vu que des infections chroniques et des mycoses se développent facilement dans les replis du ventre. Une abdominoplastie permet de prélever les excédents de peau et de tissu conjonctif par une incision horizontale au niveau du maillot. L'incision cutanée est cachée par le slip. Une silhouette générale plus harmonieuse peut être obtenue grâce à un prélèvement des amas de graisse excédentaires (liposuction) effectué le long des flancs simultanément au cours de cette abdominoplastie.

Lifting des bras

Souvent, suite à une perte de poids, après une perte d'élasticité de la peau, un relâchement cutané important se montre dans la partie supérieure des bras. Le lifting de celles-ci consiste en une combinaison de liposuction et enlèvement de peau excessive. Cette intervention peut facilement être combiné à d'autres procédés de raffermissment.

Anti-âge

Toxine botulique

La formation de rides est due à la tension chronique des muscles du visage. Ces rides modifient notre expression faciale. Souvent les rides de la colère situées dans la zone des sourcils, nous donnent un regard « méchant » alors que des rides horizontales sur le front expriment des soucis.

La toxine botulique s'est avérée être une méthode efficace et sûre pour le traitement des rides. D'autre part, le positionnement des sourcils peuvent être corrigé grâce à des micro-injections.

Etant donné que la toxine botulique est injectée par des micro-canules dans la peau ou les parties de muscles désignés préalablement, les incisions sont à peines ressenties.

Une pommade anesthésiante est appliquée sur votre peau préalablement à l'intervention. La toxine botulique a fait ses preuves également comme moyen efficace pour traiter les transpirations excessives dans les aisselles et dans des cas de migraines.

Afin de pouvoir obtenir un résultat naturel et esthétique, nous allons effectuer une analyse

individuelle et précise avant l'intervention. La documentation détaillée à l'appui de photos prises avant et après le traitement constitue un élément important dans le plan de traitement. C'est la raison pour laquelle nous vous prions, dix jours après l'intervention, de repasser pour un examen de contrôle.

L'acide hyaluronique

Le processus naturel du vieillissement engendre une perte de volume au niveau de la partie centrale du visage. Les cernes autour des yeux, des joues affaissées (« sillion nasogénien ») et des commissures de lèvres courbés vers le bas (« plis d'amertumes ») en sont les conséquences. Tous ces traits physiques nous donnent un air fatigué, épuisé et triste. Grâce à l'application de l'acide hyaluronique, nous pouvons rétablir le volume manquant, particulièrement dans la partie centrale du visage. Les cernes autour des yeux deviennent plus lisses, les joues sont remplies, les lèvres sont rebondies et les ridules aux contours des lèvres sont moins visibles.

Nous avons recours aux fillers modernes et scientifiquement approuvés avec un résultat de longue durée. Comme les fillers contiennent un analgésique, le traitement n'est pas très douloureux. Une pommade anesthésiante est ap-

pliquée sur votre peau préalablement à l'intervention.

Chirurgie reconstructive

Corrections de cicatrices

Les cicatrices peuvent non seulement être un facteur de dérangement, mais elles peuvent également susciter une stigmatisation et porter préjudice au bon fonctionnement musculaire, surtout au niveau du visage.

Souvent, elles sont dues à des brûlures, un accident ou une opération précédente.

Une correction de cicatrices vise à remédier au dysfonctionnement sous des aspects esthétiques. Nous vous proposons des méthodes opératoires comme non-opératoires comme p.ex. le micro-aiguillage (medical needling).

Otoplastie

Le décollement des oreilles est une malformation congénitale qui se manifeste parfois en association avec des pavillons d'oreille trop grands. Vu que les oreilles décollées donnent souvent lieu à une stigmatisation, des troubles psychiques peuvent déjà se révéler très tôt chez l'enfant. Cependant, une intervention chirurgicale pour

y remédier n'est pas recommandée avant l'âge de cinq ans jusqu'à ce que la croissance de l'oreille soit complètement achevée. Durant l'opération, le cartilage est affaibli, remodelé et repositionné pour reconstituer un aspect naturel de l'oreille.

Déformation tubulaire des seins

L'asymétrie et les seins tubulaires font partie des malformations de la poitrine chez les femmes. L'intervention chirurgicale vise à en rétablir respectivement configurer la symétrie, la forme et la taille. Différentes techniques opératoires existent pour y remédier, chaque fois en fonction du cas spécifique. Un examen gynécologique préalable ainsi qu'un plan d'intervention détaillé sont impérativement nécessaires afin de pouvoir concevoir un résultat optimal.

Correction de mamelons

Des mamelons ombiliqués sont considérés comme de mamelons enfoncés. Ils peuvent être corrigés par une opération chirurgicale à caractère invasif minimal sous anesthésie locale.

Tumeurs cutanées

Les tumeurs de l'épiderme peuvent être de na-

ture bénigne (naevus mélanocytyque, fibrome, lipome, hémangiome, athérome, verrues) ou maligne (basaliome, carcinome épidermoïde, mélanome maligne). Les premières peuvent être enlevées pour des raisons esthétiques et souvent une augmentation de leur taille ou un aspect douteux de la tumeur, qui exige un examen histologique du tissu, justifient leur excision. Les tumeurs malignes doivent être prélevées impérativement. Dans la plupart des cas, l'opération peut se faire sous anesthésie locale. Outre l'enlèvement intégral de la zone cutanée affectée, l'intervention plastico-chirurgicale vise à remédier aux imperfections de la peau sous tous les aspects esthétiques.

Lors de votre premier rendez-vous, nous allons vous informer de manière détaillée sur l'intervention prévue, les risques impliqués et les éventuelles complications. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.

Si vous avez encore des questions, veuillez-nous contacter !

Source: VDÄPC



DR.ASSASSI

CENTRE DE
CHIRURGIE PLASTIQUE
ET ESTHÉTIQUE



71, RUE DES GLACIS
L-1628 LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG

TEL.: +352 26 27 02 93

WWW.DR-ASSASSI.LU INFO@DR-ASSASSI.LU